



## 【祝君健康】

### 異位妊娠

異位妊娠又即宮外孕。宮外孕是指受精卵著床于子宮以外的地方。宮外孕發生的地方可在：輸卵管(佔 95%以上)、卵巢、腹腔。受精卵正常應在子宮著床，如受精卵著床于輸卵管，就不能完成懷孕過程，因子宮才有足夠的空間讓胎兒發育。因輸卵管空間有限，當受精卵長大到 6-8 周在右，輸卵管因膨脹而破裂，造成失血過多，可能會導致有生命危險。

宮外孕的原因有：輸卵管炎-因輸卵管炎症，導致輸卵管粘連、管腔變窄、纖毛受損，使受精卵蠕動到宮腔內受阻。輸卵管手術史-結紮後再通，形成狹窄。輸卵管發育不良或異常等。這些原因都是受精卵到子宮的通道受阻，導致受精卵停留在輸卵管內。

宮外孕的症狀有停經史，當懷孕期間有下腹痛，以患側為主，高度懷疑為宮外孕。當輸卵管破裂時，出現撕裂疼痛，出血流到腹腔引起疼痛，出血經陰道流出。因失血過多會致休克，出現頭暈、血壓下降，不及時搶救會導致死亡。

測 B-HCG 水平及 B 超可診斷宮外孕。如 B-HCG 水平比較低，呈弱陽性。B 超可發現孕囊是否在宮內。治療方法可 1)用藥:適用于孕囊未破，孕囊<4cm。用藥後使孕囊縮細及殺死，經陰道排出。2)手術:當生命體征不穩定，輸卵管已破及葯物治療無效時，可采取手術。將著床于輸卵管部分的孕囊切除，切口縫合。

因宮外孕與輸卵管有密切關係及導致母親、胎兒都有生命危險，所以不容忽視。預防輸卵管炎，積極治療，保持輸卵管通暢。及早做 B 超確定孕囊位置。當懷孕時出現腹痛，當可疑宮外孕時及早處理。當輸卵管破裂時，應立刻送醫院搶救，防止失血過多造成死亡。

科大醫院  
李敏儀醫生  
2008.1.15